

DO BERINGIE za poučením
i dobrodružstvím

Prosím – seznamte se...

Představujeme vám přírůstky brněnské zoologické zahrady, které najdou své nové domovy v právě dokončované části Beringie - areál KAMČATKY.

Medvěd kamčatský
Ursus arctos beringianus

Řád: šelmy **Čeľad:** medvědovití

Medvěd kamčatský žije na Kamčatce a je druhý z největších poddruhů medvěda hnědého. Jeho hlavním zdrojem potravy jsou lososi, ale živí se i různými bobulemi a travinami.

Medvěd kamčatský je extrémně silný a odolný. Má rychlé reakce a je velice pohyblivý. Má obrovskou sílu v zubech a tlapách, zuby překousne i velmi silné kosti, pařáty pohne s balvany, vyšplhá se i na téměř kolmý svah či vydrží hodiny sedět v ledové vodě. Je vynikajícím plavcem, běžcem na krátké vzdálenosti, za den dokáže ujít až desítky kilometrů.

Hmotnost: do 600 kg
Délka: až 2,4 m
Počet mláďat: 2

Rosomák
Gulo gulo

Řád: šelmy **Čeľad:** lasicovití

Rosomák trochu připomíná menšího medvěda s dlouhým ocasem, ale je přitom největší žijící kunou. Žije převážně v arktických oblastech, zejména na Aljašce, v Kanadě, Skandinávii a na Sibiři.

Je všežravec a velký jedlík, který upřednostňuje masitou stravu. Je známý svojí silou - uloví zvíře i mnohem větší, než je on sám a čelistmi je schopen rozdrtit zmrzlé maso či kosti soba. Loví zvířata velikosti kolouchů či zajíců, spokojí se však i s drobnými hlodavci, ptačími vejci, a někdy požírá i plody rostlin.

Hmotnost: 8–14 kg
Délka: 65–105 cm
Počet mláďat: 2
Délka života: 15–18 let

V textu Bernské konvence je rosomák uveden v seznamu přísně chráněných druhů.

Liška polární
Alopex lagopus

Řád: šelmy **Čeľad:** psovití

Liška polární žije v severních částech Evropy, Asie a Ameriky. Její srst je v zimě dlouhá, bílá nebo šedobílá barvy, zatímco letní je krátká a méně hustá, šedá či černá barvy. V zimě ji sněhobílá srst slouží jako dokonalé ochranné zbarvení. V létě její srst zhnědne nebo zšedne, což lišce umožní se snáze skrýt mezi kameny a rostliny.

Existují dvě barevné formy lišky polární, modrá liška v létě barvu srsti nemění.

Polární lišky žijí v trvalých párech, mláďata odchovávají v podzemních doupatech, jejich nory se 4 až 13 východy tvoří labyrint až o ploše 30 m².

Potrava lišky polární je především tvořená z drobných hlodavců a ptáků a vybírání ptačích hnízd. Liška se přizpůsobuje i na zbytcích kořisti ledních medvědů.

Hmotnost: 4,5–8 kg
Délka: cca 60 cm
Počet mláďat: 3–12
Délka života: 8–12 let

Sovice sněžná
Nyctea scandiaca

Řád: sovy **Čeľad:** puštíkovití

Sovice sněžná je svou stavbou těla skvěle přizpůsobena životu v oblastech s chladnějším klimatem. Nejhojněji se vyskytuje v tundrách severní části Evropy, Asie, Grónska a Kanady. Hnízdí na zemi a vybírá si oblasti s dostatečnou hojností potravy.

Má mohutné tělo porostlé hustým peřím a kulatou hlavu s čistě bílým obličejem. Je částečně tažná, většina populací na zimu migruje do jižnějších oblastí, nejčastěji do jižního Ruska, severní Číny, jižní Kanady a severní části USA. Živí se především malými hlodavci, nejčastěji lumíky.

Délka těla: 60 cm
Rozpětí křídel: 160 cm
Hmotnost: 1,35–2,6 kg
Počet mláďat: 5–14 vajec

Bahňáci
Charadriiformes

Řád: dvoukřídlí **Čeľad:** kulíkovití

Tento název zahrnuje malé až středně velké ptáky brodivého typu, vázané často na vodu (mokré louky, bažiny...). Jde o velmi rozmanitou skupinu, ať už jde o vzhled či prostředí. Bahňáci jsou dobří letci, často výrazně tažní. Většina druhů pochází ze severněji položených hnízdišť, často z oblastí kolem polárního kruhu. V jižních oblastech se vyskytují jen na průtahu.